

JARC sol·licita a Agricultura que informi cada pagès com l'afecta la reforma de la PAC

DdeG, Girona.
A les portes de l'entrada en funcionament de la Reforma de la PAC, el sindicat agrari Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ha demanat al Departament d'Agricultura, que faci arribar a tots els pagesos que van sol·licitar ajuts els anys 2003-2004 i 2005, les cartes informatives sobre el nombre de drets i la quantitat econòmica associada que li pertoca a cada agricultor i ramader que estava actiu en el període de referència (2000-2002).

El DARP té previst enviar aquestes cartes només als productors que van tramitar els ajuts de la DUN el 2000, 2001 i 2002. Des de JARC però, consideren que la dinàmica del sector «en la qual són freqüents compravendes de superfícies conreables, arrendaments, o fins i tot cessaments de l'activitat» pot provocar que molts dels nous propietaris desconeguin la possibilitat d'accedir a aquests ajuts que s'estructuren en el marc del denominat Pagament Únic, o de les condicions que regularan la sol·licitud de drets de la Reserva Nacional.

Espanya demana a França que aturi uns dies la pesca de l'anxova

Als pescadors espanyols no els convenç l'ajut del Govern i anuncien protestes

Efe/DdeG, Madrid.
L'Estat espanyol ha demanat a França que també faci l'aturada biològica de l'anxova de 45 dies tal com fan els pescadors espanyols per donar possibles respostes a la situació de crisi que viuen les captures d'aquesta espècie al nord de la península.

Per la seva banda, França –que hauria de començar la seva temporada de pesca el proper dia 1 de juny– vol un temps de reflexió abans de pronunciar-se sobre la petició espanyola d'establir l'aturada en la pesca d'anxova al Cantàbric, a l'espera de nous informes científics que aportin més dades exactes de la situació.

Des del Ministeri d'Agricultura també han demanat als pescadors espanyols que no surtin a la mar davant la inexistència d'una biomassa reproductora per sota els nivells de referència. La posició espanyola es basa en el fet que durant el període reservat als pescadors espanyols d'anxova, només s'han capturat 203 tones, quan la mitjana dels set anys anteriors havia estat de 7.000.

La Comissió Europa, però, ha dit que es reunirà amb Espanya i França per parlar de les mesu-



ANXOVA. La Unió Europea decidirà les mesures a prendre per resoldre la crisi.

res a prendre quan conegui els informes d'una inspecció científica que fan conjuntament els dos països al mar Cantàbric.

Un cop es conegui la informació científica, la Comissió estudiarà les possibles mesures que cal prendre per recuperar l'anxova, entre elles l'aturada biològica subvencionable que ha demanat l'Estat espanyol.

Protestes dels pescadors

A l'espera d'una resolució, els pescadors del País Basc, Cantàbria, Santander i Galícia han avisat que les mesures que proposa

el govern –al qual li havien demanat 27 milions per pal·liar la manca de captures– no els satisfà perquè asseguren que no els cobreix ni el 30% del que havien demanat i han anunciat que convocaran protestes per denunciar la seva situació i per aconseguir un acord amb el Govern.

Les confrades de pescadors, però es conformarien amb acceptar un ajut de 7 milions d'euros, sempre i quan quedés en suspens l'aturada biològica de 45 dies proposada pel Govern i se'ls permetés sortir al mar per capturar altres espècies.

Les cooperatives del Maresme volen potenciar la recuperació de la mongeta del ganxet

DdeG, Girona.
Les cooperatives agràries Conca de la Tordera (Blanes i Palafròlles), Progrés-Garbí (Malgrat de Mar) i la Baixa Tordera (Tordera) estan treballant en la recuperació de la mongeta del ganxet i participen activament en l'associació de productors que ha demanat, a la Unió Europea, el reconeixement de denominació d'origen protegida per aquest producte.

Els principals àmbits en què els productors treballen en l'actualitat són la recuperació de la varietat amb les característiques organolèptiques i de producció originals de la varietat del ganxet, així com en les presentacions del producte cuit i envasat sense perdre que perdi els valors gustatius.

El reconeixement com a DOP de la mongeta del ganxet ja compta amb el suport del Departament d'Agricultura de la Generalitat i del Ministeri d'Agricultura, i s'està elaborant un plec d'especificacions tècniques que han de complir el cultiu i el producte per certificar la seva qualitat i origen.

LA SETMANA

FIRES

- Avui i demà «Fira del Pa, la Farina i el Blat» a Castell d'Empúries i «Lookbird. La Fira dels Ocells i la Natura», a Figueres.
- El proper dia 3 començarà «EQUINOVA BANYOLES», a Banyoles. Fins al dia 5.
- Fins demà hi ha «FECSUR'05» Feria de Muestras de la Campiña Sur de Extremadura, a Azuaga (Badajoz), «VINOBLE'2005» Saló de los Vinos Nobles, Generosos, Licorosos i Dulces Especiales a Jerez de la Frontera i «AGROGANT'2005» Feria Agrícola y Ganadera de Antequera, a Antequera (Màlaga).
- «VII FERIA INTERNACIONAL DELAJO» a Montalbán de Còrdova, del 3 al 5.
- «FRESH» Conferència i exhibició internacional de fruites fresques i vegetals industrialitzats a Budapest.
- «Mundo del Vino Munich 2005» a Munich (Alemanya) del 2 al 5.
- «FRESH 2005» Conferència i ex-

hibició nacional de fruites fresques i vegetals industrialitzats, a Venècia. Del 2 al 4.

CONSELLS

- En una bona sala de munyir s'ha de complir:
 - 1.- L'ambient ha de produir la menor tensió possible sobre les vaques.
 - 2.- La premunyida ha de provocar una completa ejecció abans de començar la munyida.
 - 3.- La resta de tasques associades a la munyida s'han de fer de la mateixa manera tots els dies i a totes les munyides.
- La neteja consisteix en rentar superfícies, parets, menjadores, abeuradores i útils de manipulació. La neteja és una operació aconseguida prèvia a la desinfecció.
- Sobre els sistemes de cobicols per a vaques de llet si existeix unanimitat en què la superfície no ha de ser abrasiva, ja que provocaria ferides i erosions de difícil neteja i desinfecció a les extremitats pos-

- teriors.
- El període de gestació de les ovelles el podem dividir en tres fases, amb fenòmens fisiològics i necessitats diferents:
 - 1era. Fase. 1er mes de gestació.
 - 2ona. Fase. 2on i 3er mes de gestació.
 - 3era. Fase. 4t i 5è mes de gestació.
- La dificultat d'assimilació de fòsfor en sòl calcari pot estar compensada en part per la simbiosi de les micorrices amb les arrels.
- Existeixen dues escoles sobre com la nutrició afecta la reproducció porcina:
 - 1.- La reproducció es veu afectada quan el contingut en greix o proteïna de la reproductora cau per sota d'un determinat nivell.
 - 2.- El sistema reproductiu respon a determinades senyals que reflecteixen l'estat metabòlic de la reproductora.
- Els aneostres de veritat en truges poden ser:
 - Estacional.
 - Prepuberal.

- Post-deslletament.
- De lactació.
- De fet, a la pregunta de si realment és possible aconseguir que un robot munyeixi correctament una vaca té una resposta rotundament afirmativa.
- Especialització en el treball. Degut a la concentració del treball en setmanes diferents es pot dedicar més temps a cada una de les tasques (adopció de garrins, detecció de zels, inseminacions, etc.).
- Dietes hipercalòriques o d'alta energia desequilibren la relació energia/proteïna del regins i condiciona el consum, de pinso *ad libitum*. Si a més té un elevat percentatge de fibra sense augments proporcionals de greix, la eficàcia nutritiva del pinso i el ritme de creixement dels garrins disminueix.
- Un correcte diagnòstic en cultiu sense terra ha d'involucrar els paràmetres de la solució nutritiva aplicada, els del medi extern al substrat i els paràmetres corresponents a la solució del substrat o

- del medi radicular, avaluats com a anàlisi de drenatge o de la solució extreta mitjançant xeringa o sonda de succió del substrat o determinada mescla a determinada proporció de substrat i aigua.
- La instal·lació de túnels de polietilè per a la protecció del planter. Aquest és un dels aspectes que admeten tecnificació, incrementant rendiments i qualitat del producte.
- Les plantacions d'alls s'han de fer quan el brot arriba un 50% de la longitud del dent, en tot cas, sempre abans que el brot surti per l'àpex de la dent.
- La colza disposa d'una arrel pivotant, amb tendència natural a aprofundir, podent arribar fins a 150 cm, amb la qual cosa millora l'estructura i el drenatge del sòl, substituint en certa manera al sub-sulador.

Jesús Domingo

COSES DE L'AVIA

**LIQUIDACIÓ ESTOC
MOBLES JARDINERIA**

Ctra. Barcelona, 477 (L'Avellaneda)
GIRONA - Tel. 972 41 2



Pol. Ind. Pont del Príncep / Tel. +34 972 525 049
Av. Empordà, 44 / Fax + 34 972 525 030
17469 VILAMALLA
(Girona)
www.agricamp.com - info@agricamp.com

BLAT DE MORO

Blat de moro, gira-sol i sorgo:



Confieu en el líder

